

Urinal® D-Med

Zdravotnícka pomôcka CE 0481

- Na prevenciu opätovného výskytu infekcií močových ciest/cystitidy spôsobených *E. coli*
- Podporná liečba infekcií močových ciest

Všeobecné odporúčania

Pred použitím Urinal D-Med si pozorne prečítajte návod na použitie aj v prípade, ak ste už túto zdravotnícku pomôcku predtým používali. Informácie sa mohli zmeniť v súlade s novým výskumom a zisteniami v porovnaní s časom, keď ste otvorili posledné balenie. Napriek tomu sa má na dosiahnutie dobrého výsledku Urinal D-Med používať veľmi opatrne. Uchovajte si tento návod na použitie; možno bude potrebné si ho počas obdobia liečby prečítať.

Určenie

Urinal D-Med je určený na podpornú liečbu infekcií močového mechúra a na zabránenie opätovného výskytu infekcií močových ciest v močovom mechúre (infekcie močového mechúra alebo cystitidy) spôsobené *E. coli*. Cystitída je zápal močového mechúra, zvyčajne spôsobený infekciou močového mechúra. Bakteriálna infekcia močových ciest alebo močového mechúra sa zvyčajne vyskytuje v dôsledku výskytu črevných baktérií, ktoré sa cez močovú rúru dostanú do močových ciest, kde sa prichytia na stenu močového mechúra alebo na iné časti močových ciest a vyvolajú infekciu. Infekcie močových ciest spôsobené *E. coli* môžu zahŕňať jeden alebo viacero z nasledovných príznakov (no nemusia sa vždy takto prejavovať):

- pálenie alebo pocit bolesti počas močenia;
- nutkanie na močenie;
- časté močenie;
- bolesť brucha.

Dávkovanie a použitie

Dospelí a deti vo veku 18 rokov a starší:

- Na zabránenie opätovného výskytu infekcie močového mechúra: 1 šumivá tableta jedenkrát denne. V pohári zmiešajte šumivú tabletu s vodou (200 ml) a premiešajte. Okamžite vypite. Na perorálne použitie.
- Na podpornú liečbu: 1 šumivá tableta dvakrát denne. V pohári zmiešajte šumivú tabletu s vodou (200 ml) a premiešajte. Okamžite vypite. Na perorálne použitie. Neprekračujte dennú dávku.

Dĺžka užívania

Urinal D-Med neužívajte dlhšie ako 30 dní v jednom liečebnom období. Liečba sa môže obnoviť po 4 dňoch.

Ako pôsobi

Aktívnou zložkou je D-manóza. D-manóza sa prirodzene vyskytuje v metabolických procesoch u ľudí. D-manóza sa viaže na baktérie *E. coli*, a tým zabráňuje baktériám usadzovať sa na stenách močových ciest. Počas močenia sa potom baktérie môžu ľahko vylúčiť z tela.

Vedľajšie účinky:

Urinal D-Med má málo vedľajších účinkov a je vo všeobecnosti dobre tolerovaný. Žalúdočno-črevné príznaky, ako sú hnačka, bolesti žalúdka, plynatosť sú možné vedľajšie účinky.

Použitie počas tehotenstva a/alebo dojčenia:

Nie sú dostupné žiadne údaje o použití Urinal D-Med počas tehotenstva alebo dojčenia. Preto nemôžete tento prípravok používať počas tehotenstva alebo dojčenia.



Upozornenia:

- Neužívajte pri alergií na ktorúkoľvek zo zložiek;
- Pri predávkovaní sa môžu vyskytnúť nežiaduce účinky, ako sú plynatosť, bolesť žalúdka alebo hnačka;
- Uchovávajte mimo dosahu malých detí;
- Ak sa u vás vyskytnú alergické reakcie, ukončite užívanie Urinalu D-Med.
- Prípravok môže spôsobiť červené/ružové sfarbenie moču v dôsledku obsahu pomocnej látky extraktu z cvikly.

Poradte sa so svojím lekárom, ak:

- zistíte stopy krvi v moči;
- sa príznaky zhoršia alebo pretrvávajú po 7 dňoch;
- máte iné ochorenie (zdravotný stav) alebo užívate iné lieky;
- máte príznaky infekcie močového mechúra alebo horných močových ciest, ako je horúčka 38°C (100,4 °F) alebo vyššia, nekontrolovateľná triaška, nauzea (pocit nevoľnosti), vracanie alebo hnačka. Môžete mať infekciu horných močových ciest, ktorá si vyžaduje ďalšiu liečbu;
- ste mali v minulosti obličkové kamene.

Zloženie:

Kyselina citrónová, D-manóza, hydrogénuhličitán sodný, kukuričný škrob, prášok z cvikly, sorbitol, extrakt z lesných plodov, inulín, sukralóza.

1 šumivá tableta obsahuje 2 g D-manózy.

Neobsahuje alergény a je vhodný pre vegánov.



Pokyny uchovávania

Uchovávajte pri izbovej teplote (5-25°C) na suchom a tmavom mieste v pôvodnom obale a mimo dosahu malých detí.



Dátum expirácie

Urinal D-Med nepoužívajte po dátume uvedenom na obale: po „nepoužívajte po“.

Zdravotnícka pomôcka

Urinal D-Med je zdravotnícka pomôcka triedy IIa v súlade s európskou smernicou pre zdravotnícke pomôcky 93/42/EHS.

Dátum poslednej revízie tohto návodu na použitie:

2022-11 • 13-03180-V1.3



PK Benelux BV
Vluchtoord 17, 5406 XP Uden, Holandsko

Distribútor: STADA PHARMA Slovakia, s.r.o.,

Einsteinova 19, Digital Park III, 851 01 Bratislava,
e-mail: stada@stada.sk

CE 0481

6034/L/1/SLO

STADA